

ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ РИСК, БАЛЛЫ

№ амбулаторной карты: _____

Ф.И.О. пациентки: _____

Дата рождения: _____

Адрес: _____

Первый день последней менструации: _____

Первое УЗИ _____ / _____
(дата) (срок)

Предполагаемый срок родов: _____

Дата постановки на учёт: _____, недель беременности _____

Беременность по счёту _____, роды по счёту _____

Результаты скрининга:

Первый скрининг: _____ баллов

Второй скрининг: _____ баллов

Третий скрининг: _____ баллов

Сумма баллов до родов: _____ баллов

Интранатальный прирост: _____ баллы _____ %

Общая сумма баллов: _____

АНАМНЕСТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ. ПЕРВЫЙ СКРИНИНГ — ПРИ ПЕРВОЙ ЯВКЕ БЕРЕМЕННОЙ

Дата: _____
 Срок гестации: _____
 Врач, Ф.И.О. _____
 Подпись: _____

Факторы риска (подчеркните имеющиеся)	Оценка в баллах (обведите имеющуюся)
Социально-биологические	
Возраст матери:	
• менее 18 лет	2
• 40 лет и более	4
Возраст отца 40 лет и более	2
Профессиональные вредности:	
• у матери	3
• у отца	3
Вредные привычки у матери:	
• курение одной пачки сигарет в день	2
• злоупотребление алкоголем	4
Вредные привычки у отца:	
• злоупотребление алкоголем	2
Семейное положение: одинокая	1
Эмоциональные нагрузки	1
Рост и весовые показатели матери:	
• рост 158 см и менее	2
• масса тела на 25% выше нормы	2
Сумма баллов	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;"> A </div> (впишите сумму)

Акушерско-гинекологический анамнез

Паритет:	
• 4–7	1
• 8 и более	2

Аборты перед первыми предстоящими родами:	
• один	2
• два	3
• три и более	4
Аборты перед повторн. родами или после последних родов:	
• три и более	2
Внутриматочные вмешательства	2
Преждевременные роды:	
• одни	2
• двое и более	3
Мертворождение, невынашивание, неразвивающаяся беременность:	
• один случай	3
• два случая и более	8
Смерть в неонатальном периоде:	
• один случай	2
• два случая и более	7
Аномалии развития у детей, рождённых ранее	3
Неврологические нарушения у детей, рождённых ранее	2
Масса доношенных детей до 2500 г, 4000 г и более	2
Бесплодие:	
• 2–4 года	2
• 5 лет и более	4
Рубец на матке после операции	4
Опухоли матки и/или яичников	4
Истмико-цервикальная недостаточность, доброкачественные заболевания, деформация, перенесённая деструкция шейки матки	2
Пороки развития матки	3
Хронические воспалительные процессы и придатков, осложнения после абортов и родов, внутриматочный контрацептив	3
Внематочная беременность	3
Вспомогательные репродуктивные технологии:	
• ЭКО	1
• интрацитоплазматическая инъекция сперматозоида	2
Сумма баллов	Б
	(впишите сумму)

Экстрагенитальные заболевания матери

Сердечно-сосудистые:		
• пороки сердца без нарушения кровообращения		3
• пороки сердца с нарушением кровообращения		10
• хроническая артериальная гипертензия 1–3-й стадии		2–8–12
• варикозная болезнь		2
• гипотензивный синдром		2
Заболевания почек		4
Эндокринопатии:		
• заболевания надпочечников, нейрообменный эндокринный синдром		5–10
• сахарный диабет		10
• заболевания щитовидной железы		7
• ожирение		2
Анемия:		
• содержание гемоглобина 90 г/л		4
• содержание гемоглобина 100 г/л		2
• содержание гемоглобина 110 г/л		1
Коагулопатии		2
Миопия и другие заболевания глаз		2
Хронические специфические инфекции (туберкулёз, бруцеллёз, токсоплазмоз и др.)		3
Положительная реакция на волчаночный антикоагулянт		4
Антитела к фосфолипидам:		
• IgG от 9,99 и выше		2
• IgM от 9,99 и выше		3
Сумма баллов	В	(впишите сумму)
Сумма баллов по анамнестическим факторам	Г	(впишите сумму)

**ФАКТОРЫ БЕРЕМЕННОСТИ. ВТОРОЙ СКРИНИНГ — В 28–32 НЕД;
ТРЕТИЙ СКРИНИНГ — В КОНЦЕ БЕРЕМЕННОСТИ***

ВТОРОЙ СКРИНИНГ

Дата: _____

Срок гестации: _____

Врач, Ф.И.О. _____

Подпись: _____

ТРЕТИЙ СКРИНИНГ

Дата: _____

Срок гестации: _____

Врач, Ф.И.О. _____

Подпись: _____

Осложнения беременности (подчеркните имеющиеся)	Оценка в баллах (об- ведите имеющееся)	
	II	III
Выраженный ранний токсикоз	2	2
Рецидивирующая угроза прерывания	2	2
Отёки беременных	2	2
Гестоз:		
• лёгкой степени	3	3
• средней степени	5	5
• тяжёлой степени	10	10
Преэклампсия	11	11
Эклампсия	12	12
Обострение заболевания почек при беременности	4	4
Острые инфекции при беременности, в т.ч. острые респираторно-вирусные	4	4
Отрицательный резус-фактор или АВ0-сенсibilизация	5 или 10	5 или 10
Многоводие	3	3
Маловодие	4	4
Тазовое предлежание плода, крупный плод, узкий таз	3	3
Многоплодие	3	3
Перенашивание беременности	3	3
Неправильное положение плода (поперечное, косое)	3	3
Биологическая незрелость родовых путей в 40 нед беременности	4	4

* Заполняется по мере накопления информации.

Скрининг		
β-ХГЧ:		
• повышение содержания	3	3
• снижение содержания	4	4
АФП:		
• повышение содержания	6	6
• снижение содержания	8	8
РАРР-А:		
• повышение содержания	2	2
• снижение содержания	3	3
Сумма баллов	Д	
		(впишите сумму)

Оценка состояния плода		
Гипотрофия плода:		
• 1-й степени	10	10
• 2-й степени	15	15
• 3-й степени	20	20
Хроническая плацентарная недостаточность	4	4
Оценка КТГ по шкале Fisher W.M. (баллы):		
• >7	4	4
• 6	8	8
• 5	12	12
• 4	16	16
• <4	20	20
Сумма баллов	Е	
		(впишите сумму)
Сумма баллов по факторам беременности	Ж	
		(впишите сумму)
Общая сумма баллов пренатальных факторов (анамнестических факторов и факторов беременности)	З	
		(впишите сумму)

ИНТРАНАТАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА. ЧЕТВЁРТЫЙ СКРИНИНГ — ПРОВОДИТСЯ В РОДАХ

Дата: _____
 Срок гестации: _____
 Врач, Ф.И.О. _____
 Подпись: _____

Интранатальные осложнения (подчеркните имеющиеся)	Баллы (обведите имеющуюся)
Мекониальная окраска амниотических вод	8
Дородовое излитие вод (при отсутствии родовой деятельности в течение 6 ч)	6
Патологический прелиминарный период	4
Аномалии родовой деятельности	10
Хориоамнионит	4
Сумма баллов интранатальных факторов Ⓢ	(впишите сумму)
Общая сумма баллов перинатального риска (сумма баллов анамнестических факторов, факторов беременности и интранатальный пересчёт) Ⓚ	(впишите сумму)
Интранатальный прирост (отношение суммы баллов интранатальных факторов риска к сумме баллов пренатальных факторов, в %) Ⓛ	(впишите %)

План завершения родов _____

ИНСТРУКЦИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Определение степени перинатального риска:

- низкая степень риска — до 15 баллов;
- средняя степень риска — 15–24 балла;
- высокая степень риска — 25 баллов и более.

Схема проведения скрининга представлена в таблице. Расшифровка буквенных обозначений приведена далее.

Алгоритм скрининга по перинатальным факторам риска

Этап скрининга	Время проведения и действия врача
I	При первой явке (анамнестические факторы: $\textcircled{Г} = \textcircled{А} + \textcircled{Б} + \textcircled{В}$)
II	В 28–32 нед (факторы беременности: $\textcircled{Ж} = \textcircled{Д} + \textcircled{Е}$)
III	В конце беременности (факторы беременности: $\textcircled{Ж} = \textcircled{Д} + \textcircled{Е}$)
Примечание	При проведении II и III скрининга вычисляется «Общая сумма баллов пренатальных факторов» ($\textcircled{З} = \textcircled{Г} + \textcircled{Ж}$) По значению «Общей суммы баллов пренатального риска» ($\textcircled{З}$) определяют степень пренатального риска. При госпитализации уровень оказания помощи родовспомогательного учреждения должен соответствовать степени пренатального риска беременной: <ul style="list-style-type: none"> • низкая степень риска — I уровень; • средняя степень риска — II уровень; • высокая степень риска — III уровень
IV	В течение I и II периодов родов (интранатальные факторы — $\textcircled{И}$)
Примечание	В течение родов при изменении клинической ситуации (появлении интранатальных факторов риска, указанных в шкале), пересчитывают «Общую сумму баллов перинатального риска» ($\textcircled{К} = \textcircled{З} + \textcircled{И}$), а также вычисляют «интранатальный прирост» ($\textcircled{Л} = (\textcircled{И} / \textcircled{З}) \times 100\%$)

NB! Акушерскую тактику в родах следует изменять (этапный совместный осмотр, лечебные мероприятия, оперативное родоразрешение) в следующих случаях:

- при увеличении интранатального прироста ($\textcircled{И}$) более 30% у рожениц высокого пренатального риска ($\textcircled{З}$ — 25 баллов и более);
- при увеличении интранатального прироста ($\textcircled{И}$) более 60% у рожениц среднего пренатального риска ($\textcircled{З}$ — 15–24 балла);
- при увеличении интранатального прироста ($\textcircled{И}$) более 150% и увеличении «Общей суммы баллов перинатального риска» ($\textcircled{К}$) 25 баллов и более у рожениц изначально низкого пренатального риска ($\textcircled{З}$ — до 15 баллов).

© Радзинский В.Е., Князев С.А., Костин И.Н., 2011

© Оформление, ООО «Медиабюро Статус прензес», 2011

