О.В. Зайцева, Х.Ю. Симоновская, Д.В. Павленко

В обход необдуманых назначений

Рациональные стратегии борьбы
с острыми респираторными инфекциями у детей

Информационный бюллетень

Приложение к журналу

2019

StatusPraesens
profmedia

УДК 615.03:616-053.2

ББК 52.8:57.3

3-17

Авторы:

Зайцева Ольга Витальевна, докт. мед. наук, проф., засл. врач России, зав. кафедрой педиатрии лечебного факультета МГМСУ им. А.И. Евдокимова (Москва);

Симоновская Хильда Юрьевна, StatusPraesens (Москва);

Павленко Диана Вадимовна, StatusPraesens (Москва).

3-17 **В обход необдуманных назначений. Рациональные стратегии борьбы с острыми респираторными инфекциями у детей** / О.В. Зайцева, Х.Ю. Симоновская, Д.В. Павленко. — М. : Редакция журнала StatusPraesens, 2019. — 16 с.

ISBN 978-5-6042694-9-7

Проблема подбора рациональной терапии при острых респираторных инфекциях (ОРИ) у детей не теряет актуальности, что во многом связано с широтой спектра потенциальных возбудителей, преимущественно — вирусов. Несмотря на это, для лечения пациентов необоснованно часто применяют антибактериальные препараты, что не способствует улучшению состояния пациента и не сокращает сроки до выздоровления, однако увеличивает риск побочных эффектов. Кроме того, эмпирическое применение антибактериальных средств широкого спектра действия формирует устойчивость к ним у всех представителей микробиоты (в том числе у условных патогенов). Бездумное применение противомикробных препаратов у пациентов с ОРИ не предписывают и клинические рекомендации.

Без какой-либо терапии симптомы заболевания у большинства пациентов угасают в среднем за 11 дней, однако для облегчения состояния ребёнка широко применяют симптоматическую терапию. Так, кашель, заметно снижающий качество жизни и нарушающий сон, прекращается быстрее на фоне применения отхаркивающих и муколитических препаратов периферического действия. Традиционно для этих целей широко применяют лекарства растительного происхождения.

Издание предназначено для педиатров, специалистов амбулаторной и стационарной педиатрической сети, сотрудников и руководителей кафедр педиатрии, слушателей всех форм непрерывного медицинского образования, аспирантов, клинических ординаторов и студентов медицинских вузов.

УДК 615.03:616-053.2

ББК 52.8:57.3

ISBN 978-5-6042694-9-7

© Зайцева О.В.

© ООО «Медиабюро Статус презенс», 2019

Чего ждут от участкового врача родители ребёнка с неосложнённой острой респираторной инфекцией (ОРИ)? Как правило, педиатр считает, что его главная задача — добиться выздоровления в **рекордно короткие сроки**, назначив самые «сильные» и «современные» лекарственные препараты. Исходя из этих представлений, а также учитывая наплыв пациентов в поликлинику в «сезон простуд», многие специалисты выписывают антибиотики широкого спектра **на первом же приёме** — на всякий случай, «для подстраховки». В то же время родители могут быть вполне согласны и на **симптоматическое лечение**, особенно если им объяснят, что инфекция скорее всего вирусная, поэтому и антибиотики на момент обращения не показаны.

Хотя именно вирусы чаще всего оказываются возбудителями неосложнённых ОРИ, у сторонников агрессивной тактики есть свой аргумент: возможный риск **присоединения бактериальной инфекции**. Он особенно велик у часто болеющих и иммунокомпрометированных детей. Как же действовать правильно, добиваясь успеха, избегая осложнений, при этом не провоцируя полирезистентности микрофлоры к антибиотикам? Разумная стратегия ведения маленьких пациентов с простудными заболеваниями уже разработана, опробована и вполне соответствует **отечественным клиническим рекомендациям**¹: необходимо отдавать предпочтение симптоматической терапии и избегать необоснованного назначения противомикробных препаратов.

Распространённость ОРИ в детско-подростковой популяции в среднем составляет 88,5%, а в группе 3–6-летних достигает 94%. Характерно, что **эти показатели растут**: если в 2005 году заболеваемость ОРИ с изолированным поражением верхних дыхательных путей в возрасте до 14 лет составляла 73 646,5:100 000, то в 2016 году — уже 84 508,8:100 000².

Практически каждый ребёнок болеет ОРИ от 4 до 8 раз в год — на фоне формирования иммунной системы и постоянного расширения круга общения дети особенно предрасположены к **вирусным инфекциям**³. В то же время эти состояния считают **самоограничивающимися**: в подавляющем большинстве случаев защитные силы организма вскоре справляются с элиминацией возбудителя **самостоятельно**⁴.

Виновники торжества

Несмотря на некоторые отличия спектра возбудителей в разных странах, основной причиной ОРИ во всём мире считают именно вирусы. В лидерах — **риновирус** (вызывающий 31,5% заболеваний) и **респираторно-синцитиальный вирус** (31%)^{5,6}. На долю человеческого **метапневмовируса** приходится 13% ОРИ,

бокавируса — 11%, вируса парагриппа III типа — 10,5% и аденовируса — 7%. В случае присоединения бактериальной инфекции *Streptococcus pneumoniae* — наиболее часто выделяемый из мокроты причинный агент (9%), а *Klebsiella pneumoniae*, *Enterobacter agglomerans* и *Haemophilus influenzae* находят в 5,5; 2 и 1,5% соответственно⁵. Бактериemia при этих заболеваниях встречается крайне редко⁷.

Хотя возбудители ОРИ могут быть разными, клинические проявления практически **всегда одинаковы**. В течение 2–4 дней развиваются фебрильная лихорадка и признаки поражения верхних дыхательных путей — ринорея и затруднение носового дыхания. Из-за раздражения задней стенки глотки стекающей слизью ребёнок периодически откашливается. **Усиление кашля**, изменение его характера (навязчивый, малопродуктивный) говорит о вовлечении в патологический процесс нижних дыхательных путей. Более поздние симптомы могут включать одышку, затруднение дыхания и глотания⁸.

По всей видимости, прямое цитотоксическое действие вируса приводит сначала к дискоординации и **унетению работы ресничек** мерцательного эпителия, а затем и к слущиванию эпителиальных клеток дыхательных путей. Бокаловидные клетки в ответ на раздражение гипертрофируются и вырабатывают больше слизи, из-за нарушения цилиарного транспорта секрет **застаивается и загустевает**. Массы, состоящие из отторгшихся эпителиоцитов и слизи, вызывают сначала **закупорку бронхиол**, что приводит к чрезмерному растяжению альвеол или ателектазу⁹, а затем при достижении бронхов среднего калибра провоцируют **рефлекторный малопродуктивный кашель**.

Учитывая преобладание вирусных патогенов в этиологии ОРИ и широту их спектра, этиотропное лечение затруднено. Основные задачи **симптоматической терапии** — купирование воспаления, разжижение мокроты и облегчение её эвакуации¹⁰. Все эти действия направлены на очищение дыхательных путей от избытка слизи и предупреждение бактериального коинфицирования.

Всего! И побольше!

Парадокс: несмотря на преимущественно вирусную этиологию ОРИ, **назначение антибиотиков** для лечения этих заболеваний **чрезвычайно распространено** во всём мире¹¹ (в некоторых странах — в 90% наблюдений, в отечественной практике — в 59,6%)^{12,13}. Характерно, что на эту практику мало влияют как предписания регулирующих органов, так и результаты исследований, а назначения антибактериальных средств не меняются в зависимости от клинических симптомов, наблюдающихся у конкретного пациента.

Не ограничивает стремление «перестраховаться» и тот факт, что назначение антибиотика при ОРИ **не улучшает состояния больных**^{14,15}: почти все пациенты восстанавливают исходные респираторные параметры **без какого-либо лечения**¹⁶. В исследованиях было показано, что срок с момента начала заболевания до восстановления мукоцилиарного транспорта и выздоровления составляет **в среднем 11 дней**¹⁷. В подобной ситуации применение антибактериальных средств повышает риск побочных эффектов, а также **формирует устойчивость** к используемому средству **у всех представителей микробиоценоза**.

ИНГАЛЯЦИЯ «ИЗНУТРИ»

МЕТАБОЛИЗМ ТИМОЛА И ЕГО ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ

Тимол увеличивает объём и снижает вязкость секрета слизистой оболочки бронхов, повышает частоту биения ресничек эпителия, **восстанавливая** мукоцилиарный клиренс³.

Вывод: Благодаря выведению большей части тимола **через лёгкие**, лекарственные средства с высоким содержанием этого вещества обеспечивают эффект **«ингаляции изнутри»**.

1. Мизерницкий Ю.Л., Сулайманов Ш.А. Современные комбинированные растительные препараты в практике пульмонолога // МС. — 2019. — № 11.
2. Kohlert C., Schindler G., Marz R.W. et al. Systemic availability and pharmacokinetics of thymol in humans // J. Clin. Pharmacol. — 2002. — Vol. 42. — № 7. — P. 731–737. [PMID: 12092740]
3. Nagoor Meeran M.F., Javed H., Al Taae H. et al. Pharmacological Properties and Molecular Mechanisms of Thymol: Prospects for Its Therapeutic Potential and Pharmaceutical Development // Front. Pharmacol. — 2017. — Vol. 8. — P. 380. [PMID: 28694777]

Можно было бы предположить, что нерациональное применение антибиотиков — дефект оказания медицинской помощи, **характерный для отдельных стран** и связанный с недостаточной квалификацией медработников, отсутствием соответствующих национальных стратегий, контроля врачебных назначений и т.д. Однако статистика показывает, что **это не так!** Вне зависимости от географии исследования (Европа¹⁸, Израиль¹⁹, Бразилия²⁰, Шри-Ланка²¹ или Папуа—Новая Гвинея²²) их авторы констатируют **неизменно высокую частоту назначения антибиотиков** при ОРИ, причём спектр действия препарата может не коррелировать ни с наиболее вероятным, ни даже с точно установленным этиологическим фактором.

Безусловно, речь не идёт о какой-либо злонамеренности. Лечащий врач назначает антибиотики из-за боязни пропустить угрожающую жизни вторичную бактериальную инфекцию. Однако, согласно российским клиническим рекомендациям¹, неосложнённые ОРИ **не требуют** никакого антибактериального лечения вообще.

Необоснованное применение антимикробных средств (вкуче с использованием их в сельском хозяйстве, пищевой промышленности и т.д.) уже привело к катастрофе — появлению **полирезистентных супербактерий**, неуязвимых для всех существующих лекарственных препаратов. Из разных регионов мира сообщают о невосприимчивости половины образцов *Klebsiella pneumoniae* к карбапенемам и цефалоспорином III поколения. Как минимум 10% изолятов *Streptococcus pneumoniae* устойчивы к воздействию **пенициллина**¹⁸, а резистентность стрептококка к эритромицину, азитромицину и ко-тримоксазолу составляет 44, 61 и 89% соответственно⁵. Распространённость инфекций, вызванных метициллин-резистентным золотистым стафилококком, доходит до 12—16%²³.

Факт, который мало кто из врачей принимает во внимание: при эмпирическом применении антибиотиков широкого спектра действия резистентность формируется **не только у возбудителя** заболевания, ставшего причиной обращения за медицинской помощью, но и **у всех** представителей микробиоты пациента (в том числе у условных патогенов). Именно поэтому при очевидной необходимости назначения антибиотика приоритет следует отдавать препаратам **узкого спектра**, назначаемым по результатам определения микробной чувствительности.

В качестве характерного (и очень тревожного) примера можно привести ситуацию с **микобактериями туберкулёза**: специалисты из многих стран (в том числе из некоторых регионов России) сообщают о резистентности **более 50% штаммов** палочки Коха ко всем известным препаратам²⁴. И дело не в ошибках, допущенных при лечении именно этого заболевания: лекарственная устойчивость сформировалась за счёт **многократного неоправданного применения** различных антибактериальных средств по самым разным поводам.

К сожалению, учёт **смертности от супермикробов** в нашей стране не ведётся, но зарубежные данные вполне убедительно демонстрируют мировую трагедию — ежегодно как минимум 23 тыс. летальных исходов в США и 30 тыс. в странах Евросоюза вызваны заболеваниями, ассоциированными с полирезистентными бактериями²⁵. Помимо последствий глобального масштаба, врач должен осознавать и **резко возрастающие** риски для конкретного пациента: речь идёт о побочных эффектах лечения и трудностях с подбором терапии, а также об увеличении финансовых затрат.

Цефалоспорины, имеющие репутацию **самых безопасных** противомикробных средств, провоцируют до 3% негативных реакций (некоторые препараты этой

Исключения, подтверждающие правило

Рутинное этиологическое тестирование всех пациентов с ОРИ нецелесообразно — в большинстве случаев диагноз ставят **на основании клинической картины**. Приведённые ниже факторы позволяют выделить пациентов группы риска, нуждающихся в **лабораторном обследовании** для выявления возбудителя²⁵.

- У пациентов **6-летнего возраста** и старше бактериальная этиология заболевания более вероятна, а у дошкольников (особенно до 2 лет) около 90% ОРИ вызваны вирусами.
- Бактериальную инфекцию следует заподозрить при обнаружении **отита**.
- При **бактериальном тонзиллите** обычно не бывает катарального синдрома и конъюнктивита, столь частых при вирусной этиологии заболевания.
- При бактериальной инфекции резко нарушено общее состояние, ребёнок становится малоактивным, вялым, сонливым, больше кричит, отказывается от еды и питья, негативно реагирует на яркий свет. Также для бактериальных ОРИ характерны периферический цианоз, рвота, признаки дегидратации²⁵.

группы — до 21%)²⁶. Наиболее распространены кожные аллергические высыпания и диспептические явления (дерматит наблюдают у 25,9% пациентов, диарею — у 25,5%, тошноту и рвоту — у 7,4%). Однако при использовании цефтаролина фосамила (препарат V поколения) описаны и такие состояния, как **анафилаксия**, **острый интерстициальный нефрит**, синдром Стивенса—Джонсона, DRESS-синдром, нейтропения, тромбоцитопения, анемия и эозинофильная пневмония²⁶.

Показательно, что по сравнению с препаратами узкого спектра антибиотики широкого действия **не обеспечивают лучших результатов** лечения у детей с ОРИ, но вызывают **больше побочных эффектов**^{24,27}. Если антибактериальная терапия клинически необходима (например, на фоне ОРИ произошла активация очага хронической инфекции в лакунах миндалин), то желательно сделать посев микрофлоры с определением чувствительности патогена. Учитывая, что результаты культурального исследования станут известны лишь через 5—7 дней, можно рекомендовать использование **экспресс-тестов** для выявления бактериального возбудителя, например β-гемолитического стрептококка группы А, *Klebsiella pneumoniae* и других патогенов, для обнаружения которых подобный метод обследования разработан.

Добрая политическая воля

Помимо просветительской работы, должны быть реализованы следующие направления рационализации антибиотикотерапии²⁸.

- Государственные программы **контроля целесообразности** применения антибиотиков.
- Создание, регулярное обновление (и соблюдение!) **алгоритмов диагностики и лечения ОРИ**.

На поводу чужих ожиданий

Практически всем медицинским работникам известно, что наиболее вероятный этиологический фактор ОРИ — вирусы⁵, однако очень многие убеждены, что без антибиотиков обойтись здесь нельзя²². Как ни странно, ситуация в развитых странах мало отличается от той, что была продемонстрирована в исследовании, проведённом в 2018 году в провинциальном госпитале Папуа—Новой Гвинеи (треть врачей назначали такие препараты, будучи осведомлёнными о том, что обычно причина неосложнённой инфекции верхних дыхательных путей — небактериальная). Так, даже оповещение лечащих врачей о результатах ПЦР-исследования, подтверждающего вирусную природу ОРИ, не снижает частоту назначения антибиотикотерапии у детей²⁹.

Важный фактор в принятии решения педиатром — мнение родителей ребёнка. К сожалению, даже те, кто не склонен к самолечению, часто ожидают, что врач наверняка назначит антибиотик. Исследование³⁰, проведённое в 2012 году в Палестине, показало: около 80% респондентов осведомлены о рисках формирования микробной устойчивости. Однако этим их знания и ограничивались: 18,9% считали, что антибиотики не имеют вредных побочных эффектов, а 59% были не согласны с тем, что ОРИ чаще всего вызваны вирусами и бесследно проходят даже без лечения.

Не менее 73% родителей сами лечили своих детей антибиотиками, а 51% считали эти средства препаратами первого ряда (хотя 78% осознавали их нефро- и гепатотоксичность). Основные клинические ситуации, когда от врача ожидают назначения антибиотика, — боль в ушах (68%) и лихорадка (64%). Только 38% участников исследования никогда не просили педиатра о подобных рекомендациях.

Аналогичное исследование³¹, проведённое в Греции, демонстрирует схожие ожидания родителей: хотя 80% опрошенных знали, что ОРИ «проходят сами», 74% респондентов были уверены, что антибиотик всё же нужен, а 10% давали такие препараты своим детям без медицинской консультации. Правда, 88% опрошенных осознавали, что ненужное применение этих средств формирует резистентность возбудителей, и были готовы к проведению только симптоматической терапии (как правило, не ориентируясь в том, к какой группе относится приемлемое лекарство).

Осведомлённость населения об эффектах антибиотиков имеет тенденцию к улучшению. Так, если в 2003 году 57% респондентов знали, что такие средства неэффективны для лечения вирусных инфекций, то в 2011 году с этим утверждением соглашались уже 69% опрошенных, что, впрочем, не изменило их ожиданий относительно врачебных назначений³². Тем не менее, обращаясь к врачу, родители стремятся получить квалифицированное мнение, которому обычно доверяют. Лишь единицы готовы поменять лечащего врача, который не рекомендует соответствующий препарат³¹. В то же время специалисты, к сожалению, чаще учитывают предполагаемые запросы родственников, чем клиническую целесообразность. Статистика показывает, что педиатры выписывают антибиотики даже чаще, чем от них этого ждут: 20–90% пациентов^{12,18}.

Учитывая изложенное, самим врачам важно изменить свой подход к лечению ОРИ, сделав акцент на разъяснительной работе с родителями. Китайский

опыт показывает, что положительный эффект обеспечивает ведение **публичной отчётности ЛПУ** о назначении антибиотиков¹², как и **дополнительное обучение** специалистов коммуникации с родственниками пациентов.

Поскольку на врачебный приём отведено совсем немного времени, при решении просветительских задач следует активно использовать **раздаточные материалы и плакаты**. В восьми исследованиях была продемонстрирована польза вручения родителям **буклетов и листовок** (достоверно снижается запрос на выписку антибиотиков при ОРИ)³³, хорошие результаты дают беседы **специально подготовленных медсестёр**³⁴, в Испании с успехом применяют интерактивные терминалы с тематической информацией³⁵. Стоит отметить, что и сами врачи в ходе обсуждения диагноза, симптомов и тактики лечения перестают считать **тревожность собеседника и запрос на дополнительную информацию** ожиданием непереносимого назначения антибиотиков³⁶.

- **Определение возбудителя ОРИ** до назначения антибиотиков.
- **Расширение сферы применения препаратов симптоматического действия.**

Национальные программы борьбы с лекарственной устойчивостью бактерий действуют в Великобритании³⁷, США³⁸, Австралии³⁹, странах Юго-Восточной Азии⁴⁰ и других государствах. Специалисты отмечают положительное влияние такого системного подхода, выразившееся в **снижении нерационального применения антибиотиков**. В частности, исследование ВЕАСН⁴¹, проведённое на территории Австралии, показало, что 59,2% пациентов с ОРИ вообще не получали каких-либо медикаментов.

В большинстве развитых стран разработаны **гайдаины лечения ОРИ**⁴², в России — клинические рекомендации профессиональных медицинских сообществ, одобренные Минздравом России^{1,43}. Предписанные этими документами принципы лечения ОРИ вирусной природы включают следующие положения*.

- **Ингибиторы нейраминидазы** при гриппе А (в том числе H1N1) и В (противопоказан профилактический приём и использование при ОРИ) назначают в первые 24–48 ч болезни: осельтамивир детям с 1 года по 4 мг/кг в сутки (5 дней) или занамивир с 5 лет по 2 ингаляции (всего 10 мг) 2 раза в день (5 дней).
- Иммуностропные препараты **не рекомендованы** из-за малой достоверности лечебного эффекта (за исключением препаратов рекомбинантного интерферона детям до 3 лет).
- Использование **антибиотиков** для лечения неосложнённых ОРВИ и гриппа **не рекомендовано**, такой же тактики следует придерживаться, если в первые 10–14 дней болезни имеют место риносинусит, конъюнктивит, ларингит, круп, бронхит, бронхообструктивный синдром.
- Для контроля температуры тела при фебрильной лихорадке рекомендованы только **парацетамол** или **ибупрофен** в соответствующих возрасту дозах. Показаниями к госпитализации служат следующие состояния и симптомы.
- Возраст младше 3 мес **при фебрильной лихорадке** (в связи с высоким риском тяжёлой бактериальной инфекции).

* Приведены положения с силой рекомендации 1–2 и уровнем достоверности доказательства А.

Вместе — сила

Лечебные эффекты комбинации экстракта **травы тимьяна, листьев плюща и корня первоцвета** суммированы в фитониринговом* препарате «Бронхипрет», эффективность которого была доказана в клинических исследованиях с участием более 9000 пациентов (45% из них — дети). Исследования подтверждают его **более быстрое действие** при лечении кашля (в качестве противовоспалительного и муколитического средства) по сравнению с бромгексином и лучшую, чем при использовании лазолвана, комплаентность⁴⁴.

Препарат **оказывает противовоспалительное действие, ускоряет выведение мокроты** путём активации **биения ресничек** на не подвергшихся эксфолиации участках мерцательного эпителия бронхиол, тормозит патологическое ремоделирование периферических участков дыхательного дерева при перерастяжении альвеол, нормализует количество бокаловидных клеток и их функциональную активность, **снижает избыточный синтез** гистолитических ферментов и провоспалительных медиаторов⁴⁵.

Растительное средство достоверно уменьшает **выраженность ночного кашля** у детей (значительно эффективнее, чем ингаляция физиологического раствора через небулайзер)⁴⁶, а также сокращает **сроки выслушивания хрипов** по сравнению с другими отхаркивающими средствами⁴⁷. В другом исследовании (n=1011) было выявлено, что при лечении фитопрепаратом интенсивность и болезненность кашля снижается в 2 раза уже к четвёртому дню терапии, в том числе у детей 2–5 лет⁴⁸.

Эффективность препарата «Бронхипрет» в лечении острого бронхита также была доказана в **гвух** многоцентровых рандомизированных двойных слепых плацебо-контролируемых исследованиях. На фоне применения препарата было отмечено достоверное ускорение регресса симптомов заболевания, выразившееся в уменьшении средней частоты приступов и болезненности кашля^{10,45,49–51}. Благодаря подавлению воспаления и уменьшению продукции слизи **ослабление кашля** на 50% от первоначальной частоты регистрировали уже через 6 дней (на 2 дня раньше, чем при использовании плацебо). По сравнению с синтетическими отхаркивающими и противовоспалительными препаратами **редукция основных симптомов и аускультативных признаков воспаления** (кашель, сухие хрипы, «жёсткое» дыхание) на фоне приёма лекарственного препарата «Бронхипрет» происходила на 0,5–3,5 сут **раньше**⁴⁷.

Также продемонстрирован **синергизм** препарата «Бронхипрет» и амоксициллина при бронхите бактериальной этиологии⁵⁰. При экспериментальном бронхоальвеолите, смоделированном у животных, препарат в форме сиропа эффективно **подавляет воспалительные реакции** в лёгких и **снижает число меплазированных клеток**⁵¹.

Рекомендованные дозировки (при назначении сиропа 3 раза в день внутрь после еды)¹⁰:

- детям от 3 до 12 мес — по 1,1 мл на приём;
- от 1 до 2 лет — 2,2 мл;
- от 2 до 6 лет — 3,2 мл;
- детям 6–12 лет — 4,3 мл.

Использование лекарственного растительного препарата «Бронхипрет» в терапии кашля **соответствует рекомендациям** Немецкого респираторного общества (German Respiratory Society)⁴⁵. В нашей стране лекарственное средство зарегистрировано с 2010 года, а 6 лет спустя стратегия минимизации вмешательства **стала стандартом** и в РФ: согласно отечественным рекомендациям, разработанным Союзом педиатров России, именно средствам **симптоматической терапии** следует отдавать предпочтение при ОРИ, по возможности избегая небезоснованного назначения противомикробных препаратов¹.

Таким образом, в арсенале врача есть препарат, эффективность которого подтверждена в критериях доказательной медицины и применение целесообразно для **облегчения симптомов** при ОРИ, **ускорения выздоровления**.

* Фитониринг (phytoengineering, термин идеологически восходит к словам engineering — «конструирование» и pioneer — «новаторство») — технология производства экологически чистых и стандартизированных лекарственных средств растительного происхождения, позволяющая получить препарат с чётко определённым количеством действующих экстрактов и ожидаемым механизмом и интенсивностью действия.

- Неспособность пить либо сосать грудь.
- Сонливость или отсутствие сознания.
- Частота дыхания менее 30 в минуту или **апноэ**.
- Рвота, выраженное **обезвоживание**.
- **Фебрильные судороги** продолжительностью более 15 мин либо повторяющиеся более одного раза в течение 24 ч (стационарное лечение на весь период лихорадки).
- Фебрильная лихорадка или гипотермия в сочетании с вялостью, сонливостью, отказом от еды и питья, **геморрагической сыпью на коже**, рвотой.
- **Центральный цианоз** и/или признаки сердечной недостаточности.
- Признаки **дыхательной недостаточности**: кряхтящее дыхание, раздувание крыльев носа при дыхании, кивательные движения головой, **синхронизированные со вдохом**; тахипноэ (частота дыхания у ребёнка младше 2 мес более 60 в мин, у ребёнка в возрасте 2–11 мес — более 50 в мин, у ребёнка старше 1 года — свыше 40 в мин), втяжение уступчивых мест грудной клетки, насыщение крови кислородом меньше 92% при дыхании комнатным воздухом.

Согреть изнутри

Один из самых распространённых симптомов ОРИ у детей — кашель. Он может развиваться по разным причинам (аномалии бронхолёгочной системы, аллергические заболевания и др.), но чаще всего сопровождается простудными заболеваниями.

У детей дошкольного возраста отличительная особенность течения заболеваний верхних дыхательных путей — быстрый переход от незначительного покашливания к **мучительным приступам**. Это происходит из-за несостоятельности сократительного аппарата бронхиол и нарушения мукоцилиарного клиренса. Интенсивный непродуктивный кашель с вязкой трудноотходящей мокротой может стать причиной выраженного дискомфорта, хрипов, нарушений сна. Из-за застоя слизи

У ФИТОНИРИНГОВЫХ СРЕДСТВ ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ БАЗА — ЕСТЬ!

ФИТОСРЕДСТВА С ЭКСТРАКТАМИ ТИМЬЯНА И ПЛЮЩА: МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ И КЛИНИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Технология фитониринга при выращивании и производстве фитопрепаратов гарантирует стандартизацию, т.е. стабильность содержания действующих веществ. Это даёт возможность использовать фитониринговые препараты (в том числе «Бронхипрет») для проведения клинических исследований высокой степени достоверности с хорошей воспроизводимостью результата.

Плющ обыкновенный (*Hedera helix*) усиливает **выработку сурфактанта**, обладает **секрето- и бронхолитическим** действиями (α -гедерин воздействует на β_2 -адренорецепторы и уменьшает содержание Ca^{2+} в клетках слизистой оболочки бронхов, способствуя бронходилатации). Стимуляция рецепторов в слизистой оболочке желудка вызывает вагус-рефлекс с сокращением мышечного слоя стенки бронхов и эффективным **отхаркиванием**.

Тимьян обыкновенный (*Thymus vulgaris*) оказывает **бронхолитическое, противовоспалительное и антибактериальное** воздействие благодаря выделению **тимола** эпителиоцитами в просвет дыхательных путей.

ДИНАМИКА ИНТЕНСИВНОСТИ НОЧНОГО КАШЛЯ, n=50¹

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ КАШЛЯ И ХРИПОВ, n=60²

Вывод: Лекарственные средства на основе экстрактов тимьяна и плюща к 5-му дню терапии в 4 раза **снижают интенсивность ночного кашля**, сокращают его длительность и более чем на 60% — сроки выслушивания хрипов^{1,2}.

1. Нисевич Л.Л., Намазова Л.С., Волков К.С. и др. Всегда ли необходимы антибиотики для лечения затяжного кашля у детей? // Педиатрическая фармакология. — 2008. — №3 (5). — С. 64–70.

2. Руженцова Т.А., Будаковская А.В., Горелов А.В. Фитотерапия в лечении острых респираторных инфекций у детей // Российский медицинский журнал. — 2014. — №21. — С. 1538.

в бронхах **возможны осложнения** в виде присоединения бактериальной инфекции и развития бронхита и пневмонии.

Доказано, что без терапии симптомы ОРИ у большинства пациентов **угаснут в течение 10–14 дней**^{16,17}. Но, как правило, кашель прекращается быстрее при использовании для его лечения средств периферического действия (причём антибиотики или препараты, угнетающие кашлевой центр в продолговатом мозге, **не способны** ускорить этот процесс)¹⁵. Это вполне убедительный аргумент в пользу преимущественно **симптоматического подхода** к лечению ОРИ. Традиционно для этих целей применяют средства растительного происхождения.

В частности, для облегчения кашля при ОРИ хорошо подходят **экстракты тимьяна** (*Thymus vulgaris*, действующее вещество — тимол) и **плюща** (*Hedera helix*)^{52–56}. Первый обладает антибактериальным, антиоксидантным⁵⁶, спазмолитическим и противовоспалительным⁵⁴ эффектами, а также **увеличивает частоту биения ресничек** мукоцилиарного эпителия⁵⁷. Кроме того, клетки реснитчатого эпителия дыхательных путей активно экскретируют тимол прямо в слизь, где он оказывает своё терапевтическое действие. Благодаря этому становится возможен весьма своеобразный клинический эффект **ингаляции изнутри лёгких**^{58,59}. Экстракт плюща также обладает спазмолитическим свойством и обеспечивает **рефлекторное отхаркивание**⁴⁷.

Безопасность и эффективность применения активных субстанций тимьяна и плюща подтверждена **несколькими десятками** исследований⁶⁰, в том числе двойными слепыми рандомизированными плацебо-контролируемыми⁶¹. Например, в одном из них результативность лечения кашля у детей экстрактом плюща в **96,5%** наблюдений была охарактеризована как «хорошая» или «очень хорошая»⁵³. При совместном использовании тимьяна и плюща наблюдают **синергический эффект**⁶².

Назначая антибиотики при неосложнённых ОРИ, педиатр **вступает на зыбкую почву**: возможные ятрогенные осложнения становятся **поводом для конфликтов** с родителями и дают основания для обоснованного обвинения в оказании медицинской помощи **ненадлежащего качества**.

Такая перестраховка выглядит особенно неоправданной, если учесть, что провяления ОРИ угаснут в течение **2 нед** и без какого-либо лечения. А для облегчения состояния пациента лучше всего подходят средства **симптоматической терапии**, действие которых направлено на купирование воспаления, восстановление механизма мукоцилиарного клиренса и очищение дыхательных путей. Это позволяет не только ускорить выздоровление, но и избежать нерационального назначения противомикробных препаратов. **SP**

Литература

1. Острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ) у детей: Клинические рекомендации / Союз педиатров России. — 2016. — 33 с.
2. Здравоохранение в России. 2017: Статистический сборник / Росстат. — М., 2017. — 172 с.
3. Eckel N., Sarganas G., Wolf I.-K. Pharmacoepidemiology of common colds and upper respiratory tract infections in children and adolescents in Germany // *BMC Pharmacol. Toxicol.* — 2014. — Vol. 15. — P. 44. [PMID: 25106446]
4. Levin B.R., Baquero F., Ankomah P.P. et al. Phagocytes, antibiotics, and self-limiting bacterial infections // *Trends Microbiol.* — 2017. — Vol. 25. — №11. — P. 878–892. [PMID: 28843668]
5. Bhuyan G.S., Hossain M.A., Sarker S.K. et al. Bacterial and viral pathogen spectra of acute respiratory infections in under-5 children in hospital settings in Dhaka city // *PLoS One.* — 2017. — Vol. 12. №3. — P. e0174488. [PMID: 28346512]
6. Meissner H.C., Hall C.B. Respiratory syncytial virus / Feigin and cherry's textbook of pediatric infectious diseases. — 7th ed. — Philadelphia, Pa.: Elsevier Saunders, 2014. — P. 2407–2434.
7. Cebeý-López M., Pardo-Seco J., Gómez-Carballa A. et al. Bacteremia in children hospitalized with respiratory syncytial virus infection // *PLoS One.* — 2016. — Vol. 11. — №2. — P. e0146599. [PMID: 26872131]
8. Smith D.K., Seales S., Budzik C. Respiratory syncytial virus bronchiolitis in children // *Am. Fam. Physician.* — 2017. — Vol. 95. — №2. — P. 94–99. [PMID: 28084708]
9. Meissner H.C. Viral bronchiolitis in children // *N. Engl. J. Med.* — 2016. — Vol. 374. — №1. — P. 62–72. [PMID: 26735994]
10. Зайцева О.В., Рылов А.Л. Комплексный подход к лечению кашля // *Медицинский вестник.* — 2014. — №29 (678). — С. 12–13.
11. Ebell M.H., Radke T. Antibiotic use for viral acute respiratory tract infections remains common // *Am. J. Manag. Care.* — 2015. — Vol. 21. — №10. — P. e567–e575. [PMID: 26619058]
12. Yang L., Liu C., Wang L. et al. Public reporting improves antibiotic prescribing for upper respiratory tract infections in primary care: A matched-pair cluster-randomized trial in China // *Health Res. Policy Syst.* — 2014. — Vol. 12. — P. 61. [PMID: 25304996]
13. Эксперты: Почти в 60% случаев детям с неосложнёнными ОРВИ зря назначают антибиотики. — URL: <http://doctorpiter.ru/articles/20496/>.
14. Vandepitte W.P., Ponthong R., Srisarang S. Treatment outcomes of the uncomplicated upper respiratory tract infection and acute diarrhea in preschool children comparing those with and without antibiotic prescription // *J. Med. Assoc. Thai.* — 2015. — Vol. 98. — №10. — P. 974–984. [PMID: 26638589]
15. Zanasi A., Lanata L., Saibene F. et al. Prospective study of the efficacy of antibiotics versus antitussive drugs for the management of URTI-related acute cough in children // *Multidiscip. Respir. Med.* — 2016. — Vol. 11. — P. 29. [PMID: 27298726]
16. Bjerrum L., Munck A., Gahrn-Hansen B. et al. Health alliance for prudent antibiotic prescribing in patients with respiratory tract infections (HAPPY AUDIT): impact of a non-randomised multifaceted intervention programme // *BMC Fam. Pract.* — 2011. — Vol. 12. — P. 52. [PMID: 21689406]
17. Tulupov D.A., Soldatsky Y.L., Karpova E.P. et al. The role of infections in the development of pathology of the upper respiratory tract in children: A guide for doctors. — Moscow: Petrorush, 2010. — 218 p.
18. Butler C., Hood K., Verheij T. et al. Variation in antibiotic prescribing and its impact on recovery in patients with acute cough in primary care: Prospective study in 13 countries // *BMJ.* — 2009. — Vol. 338. — P. b2242. [PMID: 19549995]
19. Van Houten C.B., Naaktgeboren C., Buiteman B.J.M. et al. Antibiotic overuse in children with respiratory syncytial virus lower respiratory tract infection // *Pediatr. Infect. Dis. J.* — 2018. — Vol. 37. — №11. — P. 1077–1081 [PMID: 29601448]
20. Kamikawa J., Granato C.F., Bellei N. Viral aetiology of common colds of outpatient children at primary care level and the use of antibiotics // *Mem. Inst. Oswaldo Cruz.* — 2015. — Vol. 110. — №7. — P. 884–889. [PMID: 26560978]
21. Tillekeratne L.G., Bodinayake C.K., Dabrera T. et al. Antibiotic overuse for acute respiratory tract infections in Sri Lanka: A qualitative study of outpatients and their physicians // *BMC Fam. Pract.* — 2017. — Vol. 18. — №1. — P. 37. [PMID: 28302056]
22. Zamunu A., Pameh W., Ripa P. et al. Antibiotic use in the management of children with the common cold at a provincial hospital in Papua New Guinea: A point-prevalence study // *Paediatr. Int. Child Health.* — 2018. — Vol. 38. — P. 261–265. [PMID: 30079842]
23. Glenn H., Friedman J., Borecki A.A. et al. Patient demographic and clinician factors in antibiotic prescribing for upper respiratory tract infections in the Australian capital territory from 2006–2015 // *J. Clin. Diagn. Res.* — 2017. — Vol. 11. — №8. — P. FC01–FC05. [PMID: 28969150]
24. Antimicrobial resistance: Global report on surveillance. — Geneva: WHO, 2014. — 45 p.
25. Таточенко В.К., Рылов А.Л. Не перегружайте ребёнка лекарствами // *Медицинский вестник.* — 2014. — №8 (657). — С. 9–10.
26. Blumenthal K.G., Kuhlen J.L. Jr., Weil A.A. et al. Adverse drug reactions associated with ceftaroline use: A two-center retrospective cohort // *J. Allergy Clin. Immunol. Pract.* — 2016. — Vol. 4. — №4. — P. 740–746. [PMID: 27130709]
27. Gerber J.S., Ross R.K., Bryan M. et al. Association of broad- vs narrow-spectrum antibiotics

- with treatment failure, adverse events, and quality of life in children with acute respiratory tract infections // *JAMA*. — 2017. — Vol. 318. — №23. — P. 2325–2336. [PMID: 29260224]
28. Об утверждении Стратегии предупреждения распространения антимикробной резистентности: Распоряжение №2045-р от 25 сентября 2017 года. 29. Wishaupt J.O., van der Ploeg T., de Groot R. et al. Single- and multiple viral respiratory infections in children: Disease and management cannot be related to a specific pathogen // *BMC Infect. Dis.* — 2017. — Vol. 17. — P. 62. [PMID: 28077074]
30. Zyouf S.H., Abu Taha A., Araj K.F. et al. Parental knowledge, attitudes and practices regarding antibiotic use for acute upper respiratory tract infections in children: A cross-sectional study in Palestine // *BMC Pediatr.* — 2015. — Vol. 15. — P. 176. [PMID: 26561029]
31. Panagakou S.G., Spyridis N., Papaevangelou V. et al. Antibiotic use for upper respiratory tract infections in children: A cross-sectional survey of knowledge, attitudes, and practices (KAP) of parents in Greece // *BMC Pediatr.* — 2011. — Vol. 11. — P. 60. [PMID: 21729266]
32. Cabral C., Ingram J., Lucas P.J. et al. Influence of clinical communication on parents' antibiotic expectations for children with respiratory tract infections // *Ann. Fam. Med.* — 2016. — Vol. 14. — №2. — P. 141–147. [PMID: 26951589]
33. De Bont E.G., Alink M., Falkenberg F.C. et al. Patient information leaflets to reduce antibiotic use and reconsultation rates in general practice: A systematic review // *BMJ Open*. — 2015. — Vol. 5. — №6. — P. e007612. [PMID: 26041493]
34. Robinson J., Edgley A., Morrell J. MRSA care in the community: Why patient education matters // *Br. J. Community Nurs.* — 2014. — Vol. 19. — №9. — P. 436–438, 440–441. [PMID: 25184897]
35. Price E.L., Mackenzie T.D., Metlay J.P. et al. A computerized education module improves patient knowledge and attitudes about appropriate antibiotic use for acute respiratory tract infections // *Patient Educ. Couns.* — 2011. — Vol. 85. — №3. — P. 493–498. [PMID: 21392929]
36. Cabral C., Horwood J., Hay A.D. et al. How communication affects prescription decisions in consultations for acute illness in children: A systematic review and meta-ethnography // *BMC Fam. Pract.* — 2014. — Vol. 15. — P. 63. [PMID: 24708839]
37. Five year antimicrobial resistance strategy 2013 to 2018 / Department of health UK. — London, 2016. — 43 p.
38. National strategy for combating antibiotic resistant bacteria / The White House. — Washington DC, 2014. — 37 p.
39. Glenn H., Friedman J., Borecki A.A. et al. Patient demographic and clinician factors in antibiotic prescribing for upper respiratory tract infections in the Australian capital territory from 2006–2015 // *J. Clin. Diagn. Res.* — 2017. — Vol. 11. — №8. — P. FC01–FC05. [PMID: 28969150]
40. Holloway K.A., Kotwani A. et al. Antibiotic use in South East Asia and policies to promote appropriate use: Reports from country situational analyses // *BMJ*. — 2017. — Vol. 358. — P. j2291. [PMID: 28874360]
41. Britt H., Miller G., Henderson J. et al. General practice activity in Australia 2013–2014. — Sydney: Sydney University press, 2014. — 191 p.
42. Zeng L., Zhang L., Hu Z. et al. Systematic review of evidence-based guidelines on medication therapy for upper respiratory tract infection in children with AGREE instrument // *PLoS One*. — 2014. — Vol. 9. — №2. — P. e87711. [PMID: 24586287]
43. Острый бронхит: Клинические рекомендации / Союз педиатров России. — 2015. — 27 с.
44. Якупова Р.Ш. Опыт использования растительного секретолитика Бронхипрет при лечении бронхолёгочных заболеваний у детей // *Вестник ОГУ*. — 2011. — №16 (135). — С. 383–384.
45. Mastalerz-Migas A., Doniec Z., Pflusa T. Bronchipret TE® in therapy of acute infections of the respiratory tract // *Pol. Merkur. Lekarski*. — 2017. — Vol. 43. — №258. — P. 255–257. [PMID: 29298963]
46. Нисевич Л.Л., Намазова Л.С., Волков К.С. и др. Всегда ли необходимы антибиотики для лечения затяжного кашля у детей? // *Педиатрическая фармакология*. — 2008. — №3 (5). — С. 64–70. — URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vsegda-li-neobhodimy-antibiotiki-dlya-lecheniya-zatyazhnogo-kashlya-u-detey>.
47. Руженцова Т.А., Будаковская А.В., Горелов А.В. Фитотерапия в лечении острых респираторных инфекций у детей // *Русский медицинский журнал*. — 2014. — №21. — С. 1538–1540.
48. Лерпль З. Валидация клинического инструмента в измерении оценки тяжести острого бронхита у детей // *Журнал открытой респираторной медицины*. — 2013. — №12. — С. 50–66.
49. Марциан О. Лечение острого бронхита у детей и подростков // *Русский медицинский журнал*. 2010. Т. 18. №21(385). С. 1269–1273.
50. Намазова-Баранова Л.С., Котлярова М.С., Ровенская Ю.В. и др. Сравнение эффективности и безопасности фито- и антибиотикотерапии при лечении острого бронхита у детей: Результаты многоцентрового двойного слепого рандомизированного клинического исследования // *Педиатрическая фармакология*. — 2014. — №11 (5). — С. 22–29.
51. Seibel J., Pergola C., Werz O. et al. Bronchipret® syrup containing thyme and ivy extracts suppresses bronchoalveolar inflammation and goblet cell hyperplasia in experimental bronchoalveolitis // *Phyto-medicine*. — 2015. — Vol. 22. — №13. — P. 1172–1177. [PMID: 26598916]
52. Šmejkal K., Rjašková V. Use of plant extracts as an efficient alternative therapy of respiratory tract infections // *Ceska Slov. Farm.* — 2016. — Vol. 65. — №4. — P. 139–160. [PMID: 27860473]
53. Schmidt M., Thomsen M., Schmidt U. Suitability of ivy extract for the treatment of paediatric

- cough // *Phytother. Res.* — 2012. — Vol. 26. — № 12. — P. 1942–1947. [PMID: 22532491]
54. Schönknecht K., Krauss H., Jambor J. et al. Treatment of cough in respiratory tract infections: The effect of combining the natural active compounds with thymol // *Wiad. Lek.* — 2016. — Vol. 69. — № 6. — P. 791–798. [PMID: 28214817]
55. Mehreen A., Waheed M., Liaqat I. et al. Phytochemical, antimicrobial, and toxicological evaluation of traditional herbs used to treat sore throat // *Biomed. Res. Int.* — 2016. — Vol. 2016. — P. 8503426. [PMID: 27429983]
56. Zairi A., Nour S., M'hamdi N. et al. Antioxidant, antimicrobial and the phenolic content of infusion, decoction and methanolic extracts of Thyme and Rosmarinus species // *Curr. Pharm. Biotechnol.* — 2018. — Vol. 19. — № 7. — P. 590–599. [PMID: 30117391]
57. Nabissi M., Marinelli O., Morelli M.B. et al. Thyme extract increases mucociliary-beating frequency in primary cell lines from chronic obstructive pulmonary disease patients // *Biomed. Pharmacother.* — 2018. — Vol. 105. — P. 1248–1253. [PMID: 30021361]
58. Мизерницкий Ю.Л., Сулайманов Ш.А. Современные комбинированные растительные препараты в практике пульмонолога // *МС.* — 2019. — № 11. — URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-kombinirovannye-rastitelnye-preparaty-v-praktike-pulmonologa>.
59. Кеммерих Б., Эберхардт Р., Штаммер Х. Эффективность и переносимость комбинации травы тимьяна и плюща в виде жидкого экстракта против плацебо у пациентов, страдающих острым бронхитом с продуктивным кашлем. Проспективное двойное слепое плацебо-контролируемое клиническое исследование // *Русский медицинский журнал.* — 2008. — Т. 16. — № 20. — С. 1333–1340.
60. Lang C., Röttger-Lüer P., Staiger C. Respiratory diseases: Review on the clinical evidence of the ivy leaves dry extract EA 575® // *Planta Med.* — 2015. — Vol. 81. — № 12–13. — P. 968–974. [PMID: 25875509]
61. Schaefer A., Kehr M.S., Giannetti B.M. et al. A randomized, controlled, double-blind, multi-center trial to evaluate the efficacy and safety of a liquid containing ivy leaves dry extract (EA 575®) vs. placebo in the treatment of adults with acute cough // *Pharmazie.* — 2016. — Vol. 71. — № 9. — P. 504–509. [PMID: 29441845]
62. Wagner U. Phytotherapy research: A thyme-ivy combination using synergy effects in action and research // *Pharm. Unserer. Zeit.* — 2009. — Vol. 38. — № 1. — P. 83–85. [PMID: 19132654]

Научно-практическое издание

Зайцева Ольга Витальевна, **Симоновская** Хильда Юрьевна,
Павленко Диана Вадимовна

В ОБХОД НЕОБДУМАННЫХ НАЗНАЧЕНИЙ

**Рациональные стратегии борьбы с острыми респираторными
инфекциями у детей**

Информационный бюллетень

Медицинский директор: Светлана Александровна Маклецова

Креативный директор: Виталий Кристал

Редакционный директор: Александр Васильевич Иванов

Заместители редакционного директора: Ольга Анатольевна Раевская,
Хильда Юрьевна Симоновская

Научный эксперт: Светлана Ивановна Барденикова

Аппарат ответственного секретаря редакции: Мария Кириченко, Надежда Васильева

Ответственные редакторы: Диана Павленко, Сергей Легкий

Старший дизайнер: Латип Латипов

Выпускающий редактор: Анастасия Пушкарь

Вёрстка: Дмитрий Амплеев

Корректоры: Елена Соседова, Дарья Фёдорова

Художники: Жанна Грачёва, Латип Латипов, Елена Шибалева

Подписано в печать 03.10.2019. Бумага мелованная. Печать офсетная.

Формат 60×90/16. Усл. печ. л. 1. Тираж 10 400 экз.

Ответственность за содержание рекламы и публикаций «На правах рекламы» несут рекламодатели.

ООО «Медиабюро Статус презенс».

105082, Москва, Спартаковский пер., д. 2, стр. 1.

Бизнес-центр «Платформа», подъезд 9, этаж 3. Тел.: +7 (499) 346 3902.

E-mail: info@praesens.ru, сайт: praesens.ru.

Группа ВКонтакте: vk.com/praesens.

Группа в Фейсбуке: facebook.com/stpraesens.

Профиль в Инстаграме: instagram.com/statuspraesens.

Отпечатано в типографии ООО «МИНИН». 603104, г. Нижний Новгород,

ул. Краснозвёздная, д. 7А, оф. 3.

9 785604 269497

Кашель? Бронхит?

Растительный лекарственный препарат

Бронхипрет®

Для детей
с 3 месяцев*
и взрослых*

Пер. уд.: ЛС-001464 от 30.12.2011;
ЛС-000181 от 05.04.2010

- ❖ Снижает частоту и болезненность кашля¹⁻³
- ❖ Уменьшает выраженность ночного кашля^{3,4}
- ❖ Способствует уменьшению воспаления⁵

Природа. Наука. Здоровье.

www.bionorica.ru

* Бронхипрет® (сироп) – для взрослых и детей от 3 месяцев;
Бронхипрет® ТП (таблетки) – для взрослых и детей старше 12 лет.

1. Кеммерих Б. РМЖ, том 16, №20, 2008, 1333-1340 2. Марциан О. РМЖ, том 18, №21(385), 2010, 1269-1273
3. Измаил Х. Фарматека, 19(114), 2005, 86-90. 4. Нисевич Л.Л. Педиатрическая фармакология, 3(5), 2008, 64-70 5. Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Бронхипрет®.